

## ビダーザ SC 療法（骨髄異形成症候群：MDS）

### A. レジメン概要

#### 標準レジメン

		Day1	2	3	4	5	6	7	...	28
グラニセロン	3mg div/15min	↓	↓	↓	↓	↓	(↓)	(↓)		
アザチジン 注射用水	75mg/m <sup>2</sup> 適量 sc	↓	↓	↓	↓	↓	(↓)	(↓)		

#### 点滴レジメン

		Day1	2	3	4	5	6	7	...	28
グラニセロン	3mg div/15min	↓	↓	↓	↓	↓	(↓)	(↓)		
アザチジン 注射用水 生理食塩液	75mg/m <sup>2</sup> 適量 50ml div/10min	↓	↓	↓	↓	↓	(↓)	(↓)		
生理食塩液	50ml div/全開									

1 コース期間：28 日間

目標コース：□有（ ） ■無（PD まで）


標準的な投与方法は7日間投与だが、外来治療では週末の運用を考慮し、5日間投与を選択することがある。

一方、皮下出血など出血傾向がある場合には、点滴レジメンへの変更を考慮する。

### B. 投与スケジュール


#### ・標準レジメン

Day 1～7(5)



#### ・点滴レジメン

Day 1～7(5)



C. 適応：骨髄異形成症候群