

## CDDP+PEM 療法 - short hydration - (肺がん)

### A. レジメン概要


		Day1	2	3	...	21
プロイムド注 生理食塩液	150 mg 100mL div/30min	↓ ↓				
グラニセロン デキサメタゾン	3mg 9.9mg div/15min	↓ ↓				
アリムタ注 生理食塩液	500mg/m <sup>2</sup> 100mL div/10min	↓ ↓				
生理食塩液 KCL 注 硫酸 Mg 補正液	500mL 10mEq 20mEq div/60min	↓ ↓ ↓				
シスプラチン注 生理食塩液	75mg/m <sup>2</sup> 250mL div/60min	↓ ↓				
生理食塩液 KCL 注	500mL 10mEq div/60min	↓ ↓				
生理食塩液 フロセド注	50mL 20mg div/10min	↓ ↓				
デキサメタゾン	4mg p.o		↓			
デキサメタゾン	8mg p.o			↓		
フレスミン S 注	1000 μg im/9 週ごと	↓				
パンピタン	1g p.o	↓	↓	↓	↓	↓

1 コース期間：21 日間

目標コース：□有 ( ) □■無 (CDDP+PEM4 コース後、PEM メンテナンス)

## B. 投与スケジュール

Day 1



Day 2 デキサメタゾン p.o. 4mg

Day 3 デキサメタゾン p.o. 8mg

連日 パンピタン p.o. 1g/日

9週に1回 フレスミンS注射液1000μg im 1A

## C. 適応：非小細胞肺がん