

# CDDP+VNR 療法 - Very Short hydration - (肺がん)

## A. レジメン概要

		Day1	2	3	...	8	...	21
グラニセトン	3mg	↓						
デキサメタゾン	9.9mg div/15min	↓						
ビルルビン注	25mg/m <sup>2</sup>	↓				↓		
生理食塩液	50mL div/10min	↓				↓		
生理食塩液	50mL 全開	↓						
生理食塩液	500mL	↓						
KCL 注	10mEq	↓						
硫酸 Mg 補正液	20mEq div/60min	↓						
シスプラチン注	80mg/m <sup>2</sup>	↓						
生理食塩液	250mL div/60min	↓						
生理食塩液	500mL	↓						
KCL 注	10mEq div/60min	↓						
生理食塩液	50mL	↓						
フロセド注	20mg div/10min	↓						
イメンドカプセル	125 mg p.o	↓						
イメンドカプセル	80mg p.o		↓	↓				
デキサメタゾン	4mg p.o		↓					
デキサメタゾン	8mg p.o			↓				
生理食塩液	100mL div/30min					↓		

1 コース期間：21 日間


目標コース：■有 (6 コース。術後化学療法の場合は4コース) □無 ( )

## B. 投与スケジュール

Day 1

抗悪性腫瘍剤の投与1時間～1時間30分前

イメンドカプセル 125mg



Day 2 午前中 イメンドカプセル p.o. 80mg、デキサメタゾン p.o. 4mg

Day 3 午前中 イメンドカプセル p.o. 80mg、デキサメタゾン p.o. 8mg

Day 8



※Day8 は生食 100ml 投与中に側管からロゼウス投与

## C. 適応：非小細胞肺がん