

承認日：2022/11/4

## R-BAC 療法

### A. レジメン概要

		Day1	Day2	Day3	Day4	...	Day28
カロナール	400mg/body po	↓					
ホラミン注 生食	5mg/body 100mL div/30min	↓					
リツキシマブ 生食	375mg/m <sup>2</sup> (1mg/mL) Div 50mL/h※	↓					
生食	50mL div/15min	↓					
グラニセロン	3 mg div/30min		↓	↓			
トレアキシ 生食	60mg/m <sup>2</sup> 50mL div/30min		↓	↓			
キロサイド 生食	500mg/m <sup>2</sup> 400mL div/2h		↓	↓			
生食	500mL 150mL/h		↓	↓			

※オリジナルよりキロサイド投与日数減らしています

1 コース期間：28 日間


目標コース：□有（ ） ■無（PDまで）

※初回投与時：最初の 30 分は 50mg/時で開始し、患者の状態を十分観察しながら、30 分毎に 50mg/時ずつ上げて、最大 400mg/時まで上げることができる。


2 回目以降：初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合、100mg/時まで上げて投与を開始し、その後 30 分毎に 100mg/時ずつ上げて、最大 400mg/時まで上げることができる。

## B. 投与スケジュール

Day 1



Day 2.3



※Day2.3 はトレアキシリン投与終了後 120 分後よりキロサイド投与

C. 適応：悪性リンパ腫