

承認日：2023/7/24

ベネクレクスタ+アザシチジン併用療法（急性骨髄性白血病）

A. レジメン概要

| | | Day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | 28 |
|-------------------------|--|------|---|---|---|---|-----|-----|-----|----|
| ベネクレクスタ | 100mg | ↓ | | | | | | | | |
| | ※維持投与期 200mg | | ↓ | | | | | | | |
| | =400mg 400mg | | | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| グラニセロン | 3mg div/15min | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | (↓) | (↓) | | |
| アザシチジン 注射用水 生理食塩液 | 75mg/m ² 適量 50ml div/10min | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | (↓) | (↓) | | |
| 生理食塩液 | 50ml div/全開 | | | | | | | | | |


1 コース期間：28 日間

目標コース：□有（ ） ■無（PD まで）

標準的な投与方法は7日間投与だが、外来治療では週末の運用を考慮し、5日間投与を選択することがある。


一方、皮下出血など出血傾向がある場合には、点滴レジメンへの変更を考慮する。

B. 投与スケジュール



・点滴レジメン

Day 1～7(5)



※ベネクレクスタは、維持投与期=400mg 患者の状態により適宜減量する。

C. 適応：急性骨髄性白血病